



Medicació a demanda posttrasplantament de cèl·lules precursors hematopoètiques

La bossa que us entregam conté la medicació següent:

- Ondansetró 8 mg (21 comprimits)
- Metoclopramida 10 mg (21 comprimits)
- Paracetamol 1 g (21 comprimits)
- Tramadol 50 mg (10 comprimits)
- Loperamida 2 mg (20 càpsules)

1. Què són i per a què serveixen aquests medicaments?

- Ondansetró i metoclopramida s'utilitzen per tractar i per prevenir les nàusees i els vòmits.
- Paracetamol és un analgèsic i antipirètic que està indicat per al tractament del dolor moderat i de la febre.
- Tramadol és un analgèsic que pertany al grup dels opioides i que està indicat en el tractament del dolor de moderat a intens.
- Loperamida és un antidiarreic.

2. Quan i com els heu de prendre?

a. En cas de dolor:

- Preneu paracetamol 1 g cada 8 hores (dosi màxima diària 4 g).
- Si continua el dolor, el podeu alternar amb dexketoprofèn cada 8 hores (el dexketoprofèn el pautarà el vostre metge en recepta electrònica i el podreu recollir a la farmàcia).
- Usau tramadol només en cas de dolor no controlat amb paracetamol i dexketoprofèn. Preneu una càpsula cada 8 hores com a màxim.

b. En cas de nàusees i/o vòmits:

- Preneu ondansetró 1 comprimit cada 8 hores.
- En cas de nàusees o vòmits persistents, afegiu 1 comprimit de metoclopramida cada 8 hores.

c. En cas de diarrea:

- Preneu 2 càpsules de loperamida després de la primera deposició diarreica i, posteriorment, una càpsula després de cada episodi (màxim 8 capsules al dia).

Aquesta pauta pot ser modificada pel vostre metge segons l'evolució dels símptomes.

Per a més informació sobre cada medicament, podeu consultar el prospecte a la pàgina web:

<https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>



Medicación a demanda postrasplante de células precursoras hematopoyéticas

La bolsa que le entregamos contiene la siguiente medicación:

- Ondansetrón 8 mg (21 comprimidos)
- Metoclopramida 10 mg (21 comprimidos)
- Paracetamol 1 g (21 comprimidos)
- Tramadol 50 mg (10 comprimidos)
- Loperamida 2 mg (20 cápsulas)

1. ¿Qué son y para qué sirven estos medicamentos?

- Ondansetrón y metoclopramida se utilizan para tratar y prevenir las náuseas y los vómitos.
- Paracetamol es un analgésico y antipirético indicado para el tratamiento del dolor moderado y de la fiebre.
- Tramadol es un analgésico que pertenece al grupo de los opioides y está indicado en el tratamiento del dolor de moderado a intenso.
- Loperamida es un antidiarreico.

2. ¿Cuándo y cómo tiene que tomarlos?

- a. En caso de dolor:
 - Tome paracetamol 1 g cada 8 horas (dosis máxima diaria 4 g).
 - Si sigue con dolor, puede alternarlo con dexketoprofeno cada 8 horas (el dexketoprofeno lo pautará su médico en receta electrónica y lo podrá recoger en la farmacia).
 - Use tramadol solo en caso de dolor no controlado con paracetamol y dexketoprofeno. Tome una cápsula cada 8 horas como máximo.
- b. En caso de náuseas y/o vómitos:
 - Tome ondansetrón 1 comprimido cada 8 horas.
 - En caso de náuseas o vómitos persistentes, añada 1 comprimido de metoclopramida cada 8 horas.
- c. En caso de diarrea:
 - Tome 2 cápsulas de loperamida tras la primera deposición diarreica y luego una cápsula tras cada episodio (máximo 8 cápsulas al día).

Esta pauta puede ser modificada por su médico según la evolución de los síntomas.

Para más información acerca de cada medicamento, puede consultar el prospecto en la página web:

<https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>