











# INDICACIONES PARA EL INGRESO DE CÁNCER DE CÓLON

	DÍA OPERACIÓN	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Medicación	Medicación habitual según indicaciones del anestesista (se retira heparina)	Analgesia 	Si tiene dolor le administrarán la medicación necesaria	Analgesia oral 
Sonda	Sonda vesical y posible sonda nasogástrica	Retirada sonda vesical (urinaria). Posible retirada de sonda nasal si la lleva	Retirada de catéter epidural y sonda vesical si todavía no se los han retirado. Retirada drenaje si lleva	
Alimentación	Prueba tolerancia agua y caramelos sin azúcar* (consulte a la enfermera)  *Si no lleva sonda	<b>Dieta líquida</b> y retirada de sueros si la tolera 	<b>Dieta semilíquida.</b> Tome y beba lo que tolere	<b>Dieta de fácil digestión</b> 
Ejercicio	Una vez en la habitación (2 h poscirugía), <b>realice movimientos con las piernas y fisioterapia respiratoria</b> con incentivador (10 repeticiones cada hora)	<b>Fisioterapia respiratoria con incentivador, estar sentado y paseos dentro de la habitación</b> 	<b>Fisioterapia respiratoria con incentivador, estar sentado y paseos dentro y fuera de la habitación</b>	<b>Paseos dentro y fuera de la habitación</b> 
Estoma	Control por enfermera si lleva estoma 	Inicio de la docencia del estoma	Control por enfermera de hospitalización y estomatoterapeuta	Control por enfermera de hospitalización y estomatoterapeuta
Otros		Posible uso de faja abdominal (menos dolor y sensación de seguridad). Será necesario comprarla en farmacia 	 Primera analítica de control. El equipo médico le informará de los resultados	<b>Si todo está bien</b> , posible ALTA a domicilio  <b>Si ha habido algún retraso</b> en los diferentes pasos durante los días anteriores, no se preocupe, necesitará uno o dos días más para salir preparado del hospital