

INDICACIONES DURANTE EL INGRESO DE LA CIRUGÍA DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6
Analgésia	-Bomba PCa epidural -Analgésia vía oral y morfina de rescate	-Bomba PCa epidural -Analgésia vía oral	-Bomba PCa epidural -Analgésia vía oral	-Retirada bomba PCa epidural -Analgésia vía oral	Analgésia vía oral si precisa	Analgésia vía oral si precisa
Dieta	Nutrición parenteral Sorbos de agua fría por la tarde	Nutrición parenteral Líquidos (según tolerancia)	Nutrición parenteral Dieta semilíquida Suplementos nutricionales orales	Nutrición parenteral Triturada sin grasas	Disminuir nutrición parenteral Dieta sin grasas de fácil masticación	Retirada nutrición parenteral Dieta blanda sin grasas
Movilización	Sentarse mañana y tarde con ayuda	Sentarse mañana y tarde con ayuda 1 hora	Sentarse mañana y tarde con ayuda 1 hora	Iniciar paseos	Paseos	Paseos
Drenajes y sondas	Posible retirada SNG	Retirada sonda vesical	Retirada sonda vesical	Posible retirada drenajes Retirada C.Epidural	Posible retirada drenajes	Retirada vía central
Higiene	Higiene personal en cama	Higiene personal en baño	Higiene personal en baño	Higiene personal en baño	Higiene personal en baño	Higiene personal en baño
Otros	-Medias de compresión intermitente -Fisioterapia respiratoria incentivada (TRIFLOW)	-Medias de compresión intermitente -Fisioterapia respiratoria incentivada (TRIFLOW)	-Medias de compresión intermitente -Fisioterapia respiratoria incentivada (TRIFLOW)	Fisioterapia respiratoria incentivada (TRIFLOW)	Fisioterapia respiratoria incentivada (TRIFLOW)	VALORAR ALTA