

RETIRADA ANTICOAGULACIÓN

ANTICOAGULANTES

SI TOMA:	DEJAR DE TOMAR	CAMBIAR POR	CUANDO
SINTROM (ACENOCUMAROL ®) 	4 días antes de la cirugía	ENOXAPARINA (CLEXANE ®) 40 MG C/12H. SC 	3 días antes de la cirugía
WARFARINA (ALDOCUMAR ®) 	5 días antes de la cirugía		4 días antes de la cirugía
DABIGATRAN (PRADAXA ®) 	3-5 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico		2-4 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico
EDOAVAN (LIXIANA ®) 	3-4 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico		3 días antes de la cirugía
APIXABAN (ELIQUIS ®) 	3-4 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico		2 días antes de la cirugía
RIVAROXABAN (XARELTO ®) 	3-4 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico		2-3 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico

ANTIAGREGANTES

SI TOMA:	DEJAR DE TOMAR	
AAS (AAS ®, ADIRO ®, TROMALYT ®, PERSANTÍN ®, BIOPLACK ®)	5 días antes de la cirugía en caso que así se lo hayan indicado en la consulta	
TRIFUSAL (DISGREN ®)	10 días antes de la cirugía	
CLOPIDOGREL (PLAVIX ®, ISCOVER ®, DUOPLAVIN ®, VATOUD ®, MABOCLOP ®, AGRELAN®, ZYLLT ®, GREPID ®)	5 días antes de la cirugía	
TICAGRELOR (BRILIQUE ®)	3-5 días antes de la cirugía según le haya indicado su médico	
PRASUGREL (EFIENT ®)	7 días antes de la cirugía	